

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2020/668  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/05/2020

1. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश

विषय:-कोविड-19 टेस्टिंग के लिए पुनरीक्षित दिशा-निर्देश (Version 5, dated 18.05.2020)।

संदर्भ:-Indian council of Medical Research Department of Health Research-Strategy  
for COVID-19 testing in india (Version 5, dated 18.05.2020)

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में आई.सी.एम.आर द्वारा देश में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिनांक 18.05.2020 को जारी किये गये पुनरीक्षित दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. समस्त संदिग्ध व्यक्ति (ILI लक्षण वाले) जिन्होंने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा कि हो।
2. समस्त संदिग्ध व्यक्ति (ILI लक्षण वाले) जो प्रयोगशाला द्वारा पुष्टी किये गये केस के सम्पर्क में आये हो।
3. समस्त संदिग्ध व्यक्ति (ILI लक्षण वाले) स्वास्थ्य कार्यकर्ता/फ्रंटलाइन कार्यकर्ता जो कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम (containment and mitigation) में शामिल हुये हो।
4. समस्त Severe Acute Respiratory Infection (SARI) के मरीज।
5. बिना लक्षण वाले तथा उच्च जोखिम वाले व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के सीधे सम्पर्क में हो, उनका सम्पर्क से पांचवे एवं दसवे दिन के भीतर जांच का सेम्पल लिया जावे।
6. समस्त संदिग्ध (ILI लक्षण वाले) व्यक्ति जो हॉटस्पॉट/कन्टेन्मेंट जोन के निवासी हो।
7. समस्त अस्पताल में भर्ती मरीज जिनमें ILI के लक्षण प्रकट हुये हो।
8. समस्त (ILI लक्षण वाले) प्रवासी मजदूर/श्रमिक (returnees and migrants) के जांच का सेम्पल लक्षण उत्पत्ति के 7 दिवस के भीतर लिया जावे।
9. जांच के अभाव में किसी भी आपातकालीन प्रोसीजर (प्रसव सहित) को लम्बित न किया जाए उपरोक्त दर्शाए बिन्दु 1 से 8 बिन्दुओं के अनुसार कोई भी परिस्थिति होने पर सेम्पल लिया जाए।


नोट :-

- ILI case is defined as one with acute respiratory infection with fever  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  & cough.
- SARI case is defined as one with acute respiratory infection with fever  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  & cough & requiring hospitalization.
- All testing in the categories is recommended by real time RT-PCR test only.

निरंतर.....

उपरोक्त 9 बिन्दुओं के अनुसार कोविड-19 की जांच हेतु सेम्पल लेना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न :- आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी गाईड लाईन।


  
(फैज अहमद किदवाई)  
वि.क.अधि. सह स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 669

भोपाल, दिनांक 19/05/2020

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल ।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
4. प्रभारी कोविड नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें ।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, मध्यप्रदेश ।

  
वि.क.अधि. सह स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश


**INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH  
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH**

**Strategy for COVID19 testing in India (Version 5, dated 18/05/2020)**

1. All symptomatic (ILI symptoms) individuals with history of international travel in the last 14 days.
2. All symptomatic (ILI symptoms) contacts of laboratory confirmed cases.
3. All symptomatic (ILI symptoms) health care workers / **frontline workers involved in containment and mitigation of COVID19.**
4. All patients of Severe Acute Respiratory Infection (SARI).
5. Asymptomatic direct and high-risk contacts of a confirmed case to be tested once **between day 5 and day 10 of coming into contact.**
6. All symptomatic ILI within hotspots/containment zones.
7. **All hospitalised patients who develop ILI symptoms.**
8. **All symptomatic ILI among returnees and migrants within 7 days of illness.**
9. **No emergency procedure (including deliveries) should be delayed for lack of test.**  
**However, sample can be sent for testing if indicated as above (1-8), simultaneously.**

**NB:**

- *ILI case is defined as one with acute respiratory infection with fever  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  AND cough.*
- *SARI case is defined as one with acute respiratory infection with fever  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  AND cough AND requiring hospitalization.*
- *All testing in the above categories is recommended by real time RT-PCR test only.*
- **All changes incorporated in these guidelines as compared to the previous version have been indicated in bold.**

  
Anil Kumar  
19/5